



ATLAMEC INJECTION

SOLUTION INJECTABLE

COMPOSITION

Ivermectine.....	1,00 g
Excipient qsp.....	100ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'**ivermectine** est un antiparasitaire de la famille des avermectines doué d'une grande activité aussi bien sur les parasites internes qu'externes des animaux domestiques (endectocide). L'**ivermectine** agit sur les nématodes et sur les arthropodes par l'intermédiaire de l'acide gamma amino-butyrique (GABA). Elle provoque sa libération par la membrane pré-synaptique et potentialise sa liaison aux récepteurs situés sur la membrane post-synaptique. Le GABA est un neuromédiateur qui intervient dans la transmission des messages inhibiteurs entre l'inter-neurone et le neurone moteur chez les nématodes, et entre la fibre nerveuse et la cellule musculaire chez les arthropodes. Aux doses recommandées, l'**ivermectine** est très bien tolérée aussi bien chez l'adulte que chez le jeune et peut être utilisée à tous les stades de gestation. L'ivermectine n'est pas active contre la douve et les ténias.

ESPECES CIBLES

Ruminants (Bovins ovins, caprins, et camelins).

INDICATIONS

Le traitement des nématodoses gastro-intestinales et pulmonaires, des infestations externes dues aux poux et agents des gales, de l'œstrose ovine et l'hypodermose bovine.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

ATLAMEC Injection est recommandé exclusivement par voie sous cutanée à la dose unique de 1 ml de solution/50 kg de poids vif, correspondant à 0,2 mg d'ivermectine par kilogramme de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

- Ne pas utiliser chez les femelles laitières lorsque le lait ou ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.
- Ne pas utiliser chez les femelles laitières 28 jours avant la mise bas chez les bovins et camelins et 21 jours chez les petits ruminants.

EFFETS SECONDAIRES

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, aucun effet indésirable n'est observé après le traitement par **Atlamec injection**.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas injecter par voies intraveineuse ou intramusculaire.
- Ne pas fumer ni manger lors de l'utilisation du produit.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Eviter le contact avec la peau ou les yeux.
- Détruire le flacon après usage.

DELAI D'ATTENTE

* Viande et Abats,

Bovins et Camelins : 28 jours

Ovins et Caprins : 21 jours

* Lait : Ne pas utiliser chez les femelles laitières lorsque le lait ou ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25°C.
- Stabilité après ouverture du contenant: 4 Semaines

PRESENTATIONS:

Flacons de 50ml et 100 ml.