



# ATLATERAZOL-P 10%

## POUDRE ORALE

### COMPOSITION

DL-Tétramisole (s.f. chlorhydrate).....	10,00 g
Excipient q.s.p.....	100 g

### PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le Tétramisole est un anthélmintique de la famille des imidazothiazoles doué d'une grande activité sur les formes larvaires et adultes des strongles gastro-intestinaux et pulmonaires. Le mode d'action du Tétramisole est lié à une paralysie musculaire des parasites. Le Tétramisole est bien absorbé par voie orale, il diffuse bien dans tous les tissus ce qui lui permet d'atteindre les nématodes pulmonaires et les formes en hypobiose. Le tétramisole est rapidement métabolisé par le foie et éliminé par voies urinaire et biliaire.

### ESPECES CIBLES

Ovins et caprins.

### INDICATIONS

Traitement des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires.

### ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

**Voie orale** dans l'eau de boisson ou dans l'aliment aux doses uniques de :

15 mg de DL-Tetramisole /kg ou 1,77 g de poudre/10 kg de poids vif.

**NB : Calculer la ration alimentaire ou hydrique journalière et y incorporer le médicament.**

### CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

**Ne pas utiliser** chez les femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

**Ne pas utiliser** chez les équidés.

**Ne pas associer** aux organophosphorés et à toute autre substance inhibant la transmission neuro-musculaire.



### **EFFETS SECONDAIRES**

Si les doses sont respectées, aucun effet secondaire n'est observé chez les espèces cibles. Si toutefois des signes d'intoxication sont observés, l'atropine est l'antidote de premier choix du tétramisole.

### **PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Cette poudre soluble pour préparation buvable est destinée à être dissoute dans l'aliment liquide ou l'eau et ne peut pas être utilisée en l'état.

Bien respecter la dose chez les animaux déshydratés

Eviter la manipulation de ce produit en cas d'allergie

Manipuler ce produit en prenant des précautions afin d'éviter tout risque d'exposition.

Eviter de respirer les poussières et éviter le contact avec la peau et les yeux.

Garder le produit hors de la portée des enfants.

### **DELAI D'ATTENTE**

Viandes et abats : 7 jours.

### **CONDITIONS DE CONSERVATION**

Produit stable 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température  $\leq 25$  °C.

Stabilité après ouverture : 3 semaines

Stabilité après mise en solution : 6 à 8 heures

### **PRESENTATIONS:**

Sachets de 100 g, pots de 500 g et 1kg.