



ANTIBIOVIT

POUDRE ORALE

COMPOSITION

Oxytétracycline (sf. chlorhydrate).....	50,00g
Vitamine A palmitate	10 000 000,00 UI
Vitamine E acétate.....	6 000 UI
Vitamine D ₃	1 250 000,00 UI
Vitamine K ₃ (ménadione sodium bisulfite).....	8,00 g
Vitamine C.....	22,00 g
Vitamine B ₂	3,00 g
Vitamine B ₁₂	10,00 mg
Biotine.....	4,00 mg
Excipient q.s.p.....	100 g

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Antibiovit est à base d'un antibactérien à large spectre, l'Oxytétracycline, et de vitamines. L'Oxytétracycline est caractérisée par son très large spectre d'activité qui englobe la plupart des germes pathogènes chez les animaux domestiques. L'Oxytétracycline se caractérise également par une bonne biodisponibilité par voie orale, un large volume de distribution permettant d'obtenir des concentrations tissulaires très élevées et une élimination en grande partie sous forme active par le rein et la bile. L'adjonction de vitamines dans la préparation permet de soutenir l'organisme pour mieux lutter contre les maladies.

ESPECES CIBLES

Volailles

INDICATIONS

Affections à germes sensibles à l'**Oxytétracycline**. Il s'agit essentiellement de la prévention et du traitement des infections suivantes :

- La maladie respiratoire chronique 'MRC',
- Le coryza infectieux,
- Le choléra aviaire,
- La sinusite infectieuse du dindon,
- Les complications bactériennes des infections virales.



ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale dans l'eau de boisson à la dose de **20 mg d'Oxytétracycline/kg** de poids vif/jour correspondant à **0,40 g d'antibiovit/kg/jour** pendant 3 à 5 jours consécutifs.

A titre indicatif, ANTIBIOVIT peut être donné à raison de 1Kg/250 L d'eau de boisson.

Pour la préparation de la solution médicamenteuse, faire une prédilution de la quantité de poudre à administrer dans un peu d'eau avant son incorporation dans le réservoir d'eau de boisson.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance hépatique ou rénale grave.

Ne pas administrer aux sujets ayant manifestés une hypersensibilité aux tétracyclines.

Ne pas associer aux pansements digestifs à base de sels d'aluminium ou de calcium.

EFFETS SECONDAIRES

Si la dose est bien respectée, aucun effet indésirable ni secondaire n'est connu pour l'Oxytétracycline par voie orale.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- bien respecter les posologies.
- Garder le produit hors de la portée des enfants.
- Assurer une bonne hydratation des animaux durant la traitement
- Garder le produit à une température n'excédant pas 25 °C et à l'abri de la lumière.

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 7 jours

CONDITIONS DE CONSERVATION

Produit stable 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

Stable 6 à 8 heures après mise en solutions

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:

Sachets de 100 g et de 1 Kg