



RANIFEN ATLAS

SUSPENSION BUVALE

COMPOSITION

Rafoxanide.....	3,00 g
Fenbendazole.....	3,00 g
Excipient q.s.p.....	100 ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le **fenbendazole** est un anthelminthique de la famille des benzimidazoles doué d'une grande activité contre les nématodes gastro-intestinaux et pulmonaires et sur le tænia. A l'instar des autres benzimidazoles, le fenbendazole agit par inhibition de la polymérisation de la microtubuline, ce qui engendre des désorganisations cellulaires et mort du parasite par inanition. Le fenbendazole n'est pas actif sur la douve et les oestres. Alors que l'action du **rafoxanide** est essentiellement dirigée contre ces parasites. Ainsi, l'association de ces deux anthelminthiques majeurs forme un produit à large spectre, actif à la fois sur les strongles digestifs et respiratoires, sur la douve et les oestres. Notons que le rafoxanide est également doué d'une excellente activité sur les nématodes hématophages. Sur le plan pharmacologique, le fenbendazole est métabolisé dans l'organisme en plusieurs métabolites dont l'oxfendazole, doué d'une grande activité anthelminthique. Alors que le rafoxanide subit un métabolisme très lent ce qui augmente sa rémanence dans l'organisme.

ESPECES CIBLES

Ovins.

INDICATIONS

Traitement des parasitoses internes chez les espèces cibles :
Nématodoses gastro-intestinales et pulmonaires, moniézirose, fasciolose et oestrose.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale à la dose unique de 7,5 mg/kg de poids vif soit 2,5 ml/10 kg de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser chez les femelles laitières lorsque le lait ou ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.

Ne pas associer à la bromosalicylanilide, en raison de l'interaction avec le fenbendazole.



EFFETS SECONDAIRES

Si les doses recommandées sont respectées, tous les composants de **RANIFEN** sont tolérés par les espèces cibles.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Bien respecter la dose chez les femelles au début de gestation.
- Bien agiter avant usage.
- Garder le produit hors de portée des enfants.

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 42 jours.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Produit stable 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

Stabilité après ouverture : 3 semaines

PRESENTATIONS:

Flacons de 100 ml. Bidons de 250 ml, 500 ml, 1 L.