



ZURICOX

SOLUTION ORALE

COMPOSITION

Toltrazuril	2,50 g
Excipient q.s.p.....	100 ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le **toltrazuril**, principe actif de la spécialité **ZURICOX**, est un anticoccidien du groupe des triazinones actif sur tous les stades intracellulaires du développement des coccidies. Le toltrazuril agit sur les schizontes (schizogonie) et les micro- et macrogamètes (gamétogonie). Le toltrazuril interfère avec la division du noyau de la coccidie et avec l'activité des mitochondries, et induit une vacuolisation sévère du réticulum endoplasmique du protozoaire.

Le **toltrazuril** n'interfère pas avec le développement de l'immunité anticoccidien, et son efficacité est indépendante de la sévérité de l'infection.

Le **toltrazuril** est également actif contre *Toxoplasma*, *Theileria* et *sarcocystis*.

Dans l'organisme, le **toltrazuril** est éliminé essentiellement dans les fèces sous forme inchangée ou oxydée (sulfoxyde et sulfone).

ESPECES CIBLES

Volailles.

INDICATIONS

Prévention et traitement des coccidioses aviaires dues à *Eimeria acervulina*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. maxima* et *E. mitis* chez le poulet et à *E. adenoides* et *E. meleagrimitis* chez la dinde.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale dans l'eau de boisson à la posologie suivante :

Posologie de base : 7 mg de principe actif/kg de poids vif/j, soit 28 ml de solution ZURICOX par 100 kg par jour pendant 2 jours consécutifs.

Prévention : avant des périodes à haut risque (stress, vaccination, transport) en administration stratégique de 2 jours consécutifs.

Traitement : administration pendant 2 jours consécutifs en présence ou en absence d'anticoccidiens dans l'aliment.



CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine.

EFFETS SECONDAIRES

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, aucun effet indésirable n'est observé après le traitement par le Toltrazuril.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Bien respecter la posologie indiquée.

Bien agiter avant l'emploi.

Bien se laver les mains après utilisation du produit.

Eviter tout contact avec la peau ;

En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin.

Garder le produit hors de portée des enfants.

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 12 jour

Lait : sans objet

Œufs : Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine

CONDITIONS DE CONSERVATION

Produit stable 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

Stabilité après ouverture : 3 semaines

Stabilité après mise en solution : 6 à 8 heures

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:

Flacons de 500 ml et 1 litre